

Kundeinformation om behandling med HA Filler

Formål: HA Filler kan injiceres i huden samt i læberne, og har en unik evne til, at binde vand til sig og dermed udvide vævet med en udglattende, vitaliserende effekt samt give fylde og løft.

Forundersøgelse: Professionel rådgivning er essentielt for et godt resultat uanset behandling. Ved en personlig obligatorisk forundersøgelse på klinikken vil du sammen med vores specialuddannede kosmetiske sygeplejerske lægge en plan for, hvordan netop din behandling bør forløbe, for at du opnår det bedste resultat.

Betænkningstid og booking: Efter informationen om HA Filler er givet både skriftligt og mundtligt, skal der minimum gå 2 dage, før behandlingen kan finde sted, ifølge bekendtgørelse fra Sundhedsstyrelsen.

Forberedelse til behandlingen: 7 dage inden din behandling er der nogle præparater, vi anbefaler, at du undlader at tage.

Det drejer sig om hovedpinepiller, som fx Treo, Ibuprofen og Magnyl, fiskeoliekapsler og visse naturpræparater, der nedsætter blodets evne til at størkne. Dette øger risikoen for blå mærker i forbindelse med behandlingen.

Hvordan foregår behandlingen: Forud for din behandling, tages der billeder af de områder, der skal behandles. Billederne behandles fortroligt, og bruges kun til dokumentation.

Området der skal behandles desinficeres. Med en meget tynd nål injiceres der filler ind i det behandlingskrævende område.

Hvordan skal jeg forholde mig efter behandlingen: Du skal undgå at berøre det behandlede område i ca. 4 timer efter behandlingen af hensyn til infektionsrisiko. Herefter kan der lægges en let makeup.

Du kan genoptage dit arbejde umiddelbart efter behandlingen, og du har det sædvanligvis fint. Der kan der forekomme hævelse, blå mærker og rødme i det behandlede område – det er helt normalt og forsvinder efter 1–3 døgn.

Indtil den første hævelse har lagt sig, bør det behandlede område ikke udsættes for kraftig varme som sol, sauna eller solarium. Vi fraråder ligeledes, at området nedkøles med is.

Hvis der opstår enten hævelse, rødmen, smerter eller varme i det behandlede område i den efterfølgende måned, kan det være et tegn på infektion. I givet fald skal du straks henvende dig til klinikken med henblik på evt. behandling.

Hvornår kan man ikke behandles?

- Hvis du har infektion i området f.eks. aktiv akne (bumser) eller herpes (forkølelsessår). I disse tilfælde bør du afvente, indtil infektionen forsvinder enten spontant eller ved behandling
- Hvis du er gravid eller ammende

Er der risici forbundet med behandlingen?

Der kan forekomme blå mærker, hævelse og rødme i området. Dette forsvinder nogle dage efter behandlingen.

I forbindelse med selve injektionen, kan det i meget sjældne tilfælde ske, at der føres bakterier ind under huden, som kan skabe en infektion. Hvis du tidligere har haft herpesudbrud (forkølelsessår) i området, kan nålen fremprovokere en sådan reaktion. Denne reaktion kan forebygges ved brug af fx Aciclovir.

I meget sjældne tilfælde kan produktet blokere for et kar, og der kan opstå nekrose/dødt væv. I de fleste tilfælde kan produktet masseres, så der igen er fri passage til karret, og ellers kan der behandles med hyaluronidase. I ekstremt sjældne tilfælde er der på verdensplan rapporteret blindhed/nedsat syn, ved behandling med filler. Hvis der mod forventning skulle opstå en af ovenstående komplikationer, er det yderst vigtigt, at du henvender dig til klinikken, da vi har den nødvendige ekspertise til at håndtere disse situationer.



Hvor effektiv er behandlingen? Det er meget individuelt, hvor længe produktet holder. Forventet holdbarhed af behandlingen er 4-12 mdr.

Hvilke områder kan behandles? Næsten alle områder i ansigtet kan behandles for rynker og volumentab.

Gør behandlingen ondt? Produkterne indeholder lokalbedøvelse, og derfor vil det normalt ikke være nødvendigt at lokalbedøve ved behandling i ansigtet. Læberne er særlig følsomme, så her vil der være mulighed for lokalbedøvelse inden behandlingen udføres.